ZESTAWIENIE WARUNKÓW POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK W ZALEŻNOŚCI OD ZLECONEGO BADANIA

PARAMETR	MATERIAŁ	WARUNKI POBRANIA	TEMP. I CZAS PRZECHOWYWANIA	TEMP. I CZAS TRANSPORTU	MIN. ILOŚĆ MATERIAŁU	CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK *) (DNI ROBOCZE)
Witamina D • 25(OH)D • 24,25(OH)$_2$D$_3$	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
Aminokwasy	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Aminokwasy +Alloizoleucyna	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Acylokarnityny	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Homocysteina	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	po 12-godzinnym poście	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
3-O-metylodopa	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	rano na czczo	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	20
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	sucha kropla krwi pobrana na bibułę**)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Deficyt arginazy (arginina/ornityna)	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 5 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Indeks glutationu	sucha kropla krwi pobrana na bibułę***)	po 12-godzinnym poście	2-8°C do 7 dni w torebce aluminiowej z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 5 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10

PARAMETR	MATERIAŁ	WARUNKI POBRANIA	TEMP. I CZAS PRZECHOWYWANIA	TEMP. I CZAS TRANSPORTU	MIN. ILOŚĆ MATERIAŁU	CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK *) (DNI ROBOCZE)
DAO	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	po 3-godzinnym suszeniu wysłać bezzwłocznie	temperatura otoczenia, do 48h	4 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 200 µl krwi)	10
LPC– pochodne VLCFA	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Lizosfingomieliny	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Glukozylosfingozyna (LysoGb1)	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Hemoglobina glikowana (HbA1c)	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Metoksykatecholaminy • Metanefryna • Normetanefryna • 3-Metoksytyramina	osocze (EDTA)	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	7
Witamina D • 25(OH)D • 24,25$(OH)_2D_3$	surowica / osocze	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	7
Aminokwasy	surowica / osocze****)	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Homocysteina	surowica / osocze	po 12-godzinnym poście	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	7
Witamina A	surowica / osocze	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Witamina E	surowica / osocze	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10

PARAMETR	MATERIAŁ	WARUNKI POBRANIA	TEMP. I CZAS PRZECHOWYWANIA	TEMP. I CZAS TRANSPORTU	MIN. ILOŚĆ MATERIAŁU	CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK *) (DNI ROBOCZE)
Koenzym Q10	surowica / osocze	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Lizosfingomieliny (LSM, LSM-509)	surowica / osocze	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	zamrożone, pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Glukozylosfingozyna (LysoGb1)	surowica	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	zamrożone, pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Globotriaozylosfingozyna (LysoGb3)	surowica	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	zamrożone, pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml	10
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	krew pełna (EDTA)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	2 ml	10
PEth	krew pełna (EDTA)	o dowolnej porze, przynajmniej 24 h od spożycia alkoholu	-20°C do 5 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	2 ml	10
Kwasy organiczne (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	10
Puryny i pirymidyny	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	20
SAICAR i S-Ado i AICAR (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	20
Analiza toksykologiczna	mocz	o dowolnej porze, ale nie później niż do 72h od momentu potencjalnego narażenia na substancję	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	10

GHB	mocz	o dowolnej porze, ale nie później niż do 12 h od momentu potencjalnego narażenia na substancję	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	10
Profil steroidowy	mocz	dobowa zbiórka moczu	w czasie zbiórki dobowej przechowywać w chłodnym miejscu; próbkę do badania ze zbiórki dobowej przechowywać w temp. 2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml	40

Objaśnienia:

*) Liczony od chwili przyjęcia materiału przez Laboratorium
**) Bibuła nasączona roztworem zabezpieczającym przed rozkładem kwasów tłuszczowych
***) Bibuła nasączona roztworem zabezpieczającym przed redukcją glutationu
****) Za wyjątkiem osocza EDTA

UWAGA: Szczegóły dotyczące przygotowania pacjenta przed pobraniem są dostępne w poszczególnych instrukcjach pobrań